



ที่ บร ๗๑๙๐๑/ว ๔๔

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกล่าม
อำเภอลำปลายมาศ บุรีรัมย์ ๓๑๑๓๐

๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อฯ โดยยุงลาย

เรียน กำนันตำบลโคกกล่าม/ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่.....

อ้างถึง หนังสืออำเภอลำปลายมาศ ที่ บร ๐๐๒๓.๒๕/ว ๑๑๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกรมควบคุมโรค ที่ สธ ๐๔๑๑.๔/๑๙๙

จำนวน ๑ ฉบับ

๒. สำเนาสื่อประชาสัมพันธ์

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง อำเภอลำปลายมาศ ขอแจ้งเรื่องขอความร่วมมือดำเนินมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อฯ โดยยุงลาย พบผู้ป่วยจำนวนมาก ข้อมูลจากรายงาน ๕๐๖ กองระบาดวิทยา ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ โรคไข้เลือดออกพบผู้ป่วยสะสม ๑๕๓,๗๓๔ ราย อัตราป่วย ๒๓๒.๔๗ ต่อแสนประชากร ผู้ป่วยเสียชีวิต ๑๖๘ ราย โรคไข้วัดช้อยุงลายพบผู้ป่วยสะสม ๑,๓๗๑ ราย อัตราป่วย ๒.๐๗ ต่อแสนประชากร และโรคติดเชื้อไวรัสซิกา พบผู้ป่วยสะสม ๗๔๒ ราย อัตราป่วย ๑.๑๒ ต่อแสนประชากรและการพยากรณ์โรคในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ มีแนวโน้มที่จะเกิดการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง นั้น

เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อฯ โดยยุงลาย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกล่าม จึงขอความร่วมมือจากท่านแจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลดังกล่าวให้ประชาชนในพื้นที่ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางกุลลาบ เมรสนต์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกล่าม

สำนักปลัด

โทร. ๐๔๔-๖๖๖-๒๘๘

ผู้ประสานงาน: นางสาวลาวัลย์ ปะกะตั้ง โทร. ๐๖๓๐๓๕๓๔๓๐



ที่ สธ ๐๔๑๑.๔/๑๕๖๗

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เลขรับ 1471
วันที่ 11 ม.ค. 2567
เวลา

กรมควบคุมโรค

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๙ มกราคม ๒๕๖๗

เลขรับ 110
วันที่ 11 ม.ค. 2567
เวลา 15.49

เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อฯ โดยยุงลาย
เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

จากสถานการณ์โรคติดต่อฯ โดยยุงลายในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ พบผู้ป่วยจำนวนมาก ข้อมูล
จากรายงาน ๕๐๖ กองระบาดวิทยา ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ โรคไข้เลือดออก พบผู้ป่วยสะสม ๑๕๓,๗๓๔ ราย
อัตราป่วย ๒๓๒.๕๗ ต่อแสนประชากร ผู้ป่วยเสียชีวิต ๑๖๘ ราย โรคไข้ปวดข้อยุงลาย พบผู้ป่วยสะสม
๑,๓๗๑ ราย อัตราป่วย ๒.๐๗ ต่อประชากรแสนคน และโรคติดเชื้อไวรัสซิกา พบผู้ป่วยสะสม ๗๕๒ ราย
อัตราป่วย ๑.๑๒ ต่อประชากรแสนคน และจากการพยากรณ์โรคในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ มีแนวโน้มที่จะเกิดการ
แพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง

เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดของโรคติดต่อฯ โดยยุงลาย กรมควบคุมโรคจึงขอความร่วมมือ
ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อฯ โดยยุงลาย ดังนี้

๑. ดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรคติดต่อฯ โดยยุงลาย โดยเน้นการดำเนินงานควบคุม
พาหะนำโรภายใน ๑ วัน หลังได้รับรายงาน พ่นสารเคมีและกำจัดลูกน้ำยุงลาย รัศมี ๑๐๐ เมตร รอบบ้านผู้ป่วย
๒. ขอความร่วมมือเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งสนับสนุนทรัพยากรในการ
ควบคุมโรคติดต่อฯ โดยยุงลายให้เพียงพอ รวมทั้งสนับสนุนยาหากันยุง สเปรย์ไล่ยุง และสเปรย์กำจัดยุง ให้กับ
ประชาชนในพื้นที่
๓. สื่อสารประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรมรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายอย่างต่อเนื่อง
และสนับสนุนการจัดกิจกรรมจิตอาสาทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธงชัย กิตติหัตถยากร)
อธิบดีกรมควบคุมโรค

02 ๖๑๐ ๓๑๐๔ - ๕

3139

กองโรคติดต่อฯ โดยแมลง
โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๓๑๐๔
โทรสาร ๐ ๒๕๕๑ ๘๔๓๓

การป้องกัน

๑. **ควบคุมสิ่งแวดล้อม** ด้วยกำจัด และลด แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โดยใช้หลัก 5ป.๑ข.

๒. **การป้องกันส่วนบุคคล** ด้วยการใช้ยาให้ถูกต้อง ได้แก่ การสวมใส่เสื้อแขนยาวกางเกงขายาวนอนกางมุ้งการใช้มุ้งยุง ทายากันยุง



๓. **ใช้สารเคมีควบคุม** เดิมทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายในน้ำเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย ใช้สารเคมีพ่น หรือจุดยากันยุงเพื่อกำจัดยุงตัวเต็มวัย



โรคไข้เลือดออก



ด้วยความปรารถนาดีจาก
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกล่าม
อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์


โรคไข้เลือดออก (Dengue Fever)



ติดต่อกันได้โดยมียุงลายเป็นแมลงนำโรคเมื่อยุงลายตัวเมียกัด และดูดเลือด ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะไข้จะไวรัสดังนี้ จะเข้าสู่กระแสเลือดและเพิ่มจำนวนมากขึ้น เมื่อยุงที่มีเชื้อไวรัสแดงก็ไปกัดคนอื่น ๆ ต่อ ทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกตาม

เชื้อไวรัสแดงก็มีทั้งหมด 4 สายพันธุ์ ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกที่เคยได้รับเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใดจะมีภูมิคุ้มกันเฉพาะสายพันธุ์นั้น หากได้รับเชื้อไวรัสสายพันธุ์ที่ต่างออกไปจากครั้งแรก ก็สามารถเป็นไข้เลือดออกได้

วงจรชีวิตยุง



อาการ

๑. ระยะมีไข้ (๒-๗ วัน)

ไข้สูง ๓๘.๕ - ๔๑ องศาเซลเซียสปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามร่างกาย เบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง วิงเวียน



๒. ระยะวิกฤต/ช็อก (จะเกิดขึ้นเมื่อไข้เริ่มลดลง)

ไข้ลดลงอย่างรวดเร็ว ซึมลง ตัวเย็น มือเท้า เย็นกระสับกระส่าย ชีพจรเบาเร็ว หากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันที อาจมีโอกาสเสียชีวิตได้



๓. ระยะฟื้นตัว

(หากไม่มีอาการช็อกในระยะที่ ๒ อาการป่วยจะดีขึ้น) ชีพจรเต้นเป็นปกติ เริ่มปัสสาวะมากขึ้นเริ่มรับประทานอาหารได้ มีสีน้คนตามร่างกายหรือเรียกว่าผื่นหาย



โรคไข้เลือดออก (Dengue Fever)

ปัจจุบันยังไม่มียาต้านเชื้อไวรัสไข้เลือดออกโดยตรงการรักษาโรคนี้นี้จึงเป็นการรักษาตามอาการ และระดับประคองให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้เอง ดังนี้

- ถ้ามีไข้สูง ควรใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดตัวเพื่อลดไข้
- หากจำเป็นต้องให้ยาลดไข้ควรใช้ ยาพาราเซตามอลห้ามใช้ยาแอสไพริน หรือยาในกลุ่มเอ็นเสด (NSIAN) เพราะมีผลทำให้เลือดออกง่ายกว่าปกติ
- ควรรับประทานอาหารอ่อน ย่อยง่าย ถ้าเบื่ออาหารหรือรับประทานอาหารได้น้อยแนะนำให้ดื่มน้ำผลไม้ หรือน้ำเกลือแร่แทนน้ำเปล่า
- ถ้าอาเจียนมาก ให้จับน้ำเกลือแร่ ครั้งละน้อยๆ บ่อยๆ
- ควรรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีสี แดงสีน้ำตาล หรือสีดำ

