



ที่ บร ๗๑๙๐๑/ว ๑๖๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่ำ^ก
อำเภอลำปลายมาศ บุรีรัมย์ ๓๐๑๓๐

๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาชนสัมพันธ์มาตราการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคติดเชื้อไวรัสซิกา
เรียน กำนันตำบลโคกล่ำ/ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่.....

อ้างถึง หนังสืออำเภอลำปลายมาศ ที่ บร ๐๐๒๓.๒๕๕/ว ๑๗๘ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาสือประชาสัมพันธ์เพื่อเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจาก

โรคติดเชื้อไวรัสซิกา

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึงอำเภอลำปลายมาศ แจ้งเรื่องขอความร่วมมือประชาชนสัมพันธ์มาตราการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคติดเชื้อไวรัสซิกา กรมควบคุมโรค รายงานผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม – ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ พบรู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสซิกาทั่วประเทศ จำนวน ๔๙๕ ราย โดยจังหวัด ที่พบผู้ป่วยสูงสุด ๕ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดตราด จังหวัดแพร่ และ จังหวัดระยอง นั้น

เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสซิกา องค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่ำ จึงขอความร่วมมือจากท่านแจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลดังกล่าวให้ประชาชนในพื้นที่ทราบในการติดต่อและการแพร่เชื้อของโรคติดเชื้อไวรัสซิกาตลอดถึงการป้องกันตนเองจากโรคดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางกุหลาบ เมรสนัด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่ำ

สำนักปลัด

โทร. ๐๔๔-๖๖๖-๒๘๘

โทรสาร ๐๔๔-๖๖๖-๒๘๙

ผู้ประสานงาน: นางสาวล่าวัลย์ ประภะตัง โทร. ๐๖๓๐๓๕๓๔๓๐

โรคติดเชื้อไวรัสซิกา ภัยเงียบจากยุงลาย



“โรคติดเชื้อไวรัสซิกา” หรือ “โรคไข้ซิกา” เกิดจากการติดเชื้อไวรัสซิกา อยู่ในตระกูลฟลาวิไวรัส (Flaviviruses) มีลักษณะคล้ายคลึงกับไวรัสไข้เหลือง, ไวรัสแดงกี, ไวรัสเวลต์ไนล์ และไวรัสไข้สมองอักเสบเจวี มีไข้ลายเป็นพาราห์โนโรค โรคเฉื่อยๆ ในฤดู ป่วยแล้วหายได้เอง อาการโรคไม่รุนแรง มีปัญหาเฉพาะกับบุตรที่ตั้งครรภ์

อาการ



มีไข้



ปวดศีรษะ



ตาแดง



มีผื่นแดง



ปวดข้อ
ปวดกล้ามเนื้อ



หากได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง อาการเหล่านี้จะทุเลาลงภายในเวลา 2 - 7 วัน



ปกติ



ผิดปกติ

การติดเชื้อในสตรีเมื่อครรภ์ จะทำให้เกิดภาวะศีรษะเล็กในเด็กแรกเกิด (Microcephaly)

การรักษา

ล้วนใช้ญี่มีอาการไม่รุนแรง สามารถรักษาได้โดย...



1 พักผ่อน
ให้เพียงพอ



2 ดื่มน้ำมาก ๆ



3 หากมีไข้ให้เก็บยาพาราเซตามอล
พาราเซตามอล

▶ หากอาการไม่ดีขึ้นควรรีบไปพบแพทย์ ◀

ขอขอบคุณข้อมูลจาก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข



การป้องกัน



เก็บบ้าน ใช้ละอุดปลอดไปรัง



เก็บขยะ ดัดแปลงขยะ
และหั่นใช้เรียบร้อย



เก็บน้ำ ปิดฝาภาชนะให้สนิท
หรือเทน้ำทิ้ง เพื่อไม่ให้บุยงลาย
วางไป และอาทิตย์อยู่ในบ้าน

กองสาธารณสุขท้องถิ่น : กลุ่มงานป้องกันโรค